



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)
من ٢٠٢٢/٩/١ حتى ٢٠٢٣/٣/٠٦ موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الأصناف للأقطان المصرية															الصف	
super Giza Bci ٩٤	super Giza ٩٤ reel cotton	جيزة ٩٥	Extra Giza ٩٣	جيزة ٩٨	جيزة ٩٤ super propagation	سوبر جيزة ٩٤ BCI PROPAGATION	سوبر جيزة ٩٤	سوبر جيزة ٨٦	أكسترا جيزة ٩٢	أكسترا BCI ٩٢	أكسترا جيزة ٩٦	أكسترا BCI ٩٦	سوبر جيزة ٩٧	جيزة ٨٧	أكسترا جيزة ٤٥	الصفة
٣.٤٧	٤.٠٢	٤.٤٤	٢.٣٧	٤.٥٠	٣.٨٥	٤.٠٠	٣.٩١	٤.٤٥	٣.٦٧	٣.٦٣	٤.٠٠	٤.٠٣	٣.٩٩		٣.٠١	قراءة الميكرونير (ميكروجرام/بوصة)
٣٤.١٥	٣٤.٦٠	٢٩.٥٣	٣٥.٠٤	٣١.٦٤	٣٤.٣٥	٣٤.٣٥	٣٤.١٥	٣٢.٨٥	٣٣.٣٥	٣٣.٢٦	٣٥.٩٥	٣٥.٧٧	٣٣.٤٦		٣٥.٢٧	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٧.٦	٨٦.٧	٨٣.٣	٨٦.٥	٨٦.٧	٨٧.١	٨٧.٣	٨٦.٩	٨٦.٦	٨٦.٩	٨٦.٩	٨٨.٣	٨٧.٢	٨٦.١		٨٦.٧	نسبة الإنتظام (%)
٥.٤	٥.٤	٧.٧	٥.٦	٥.٩	٥.٥	٥.٤	٥.٥	٥.٨	٥.٧	٥.٧	٥.٣	٥.٤	٥.٨		٥.٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٠.١	٤٠.٥	٣٦.٦	٣٧.٢	٣٨.٧	٤١.٩	٤٢.٣	٤١.٣	٤٥.٣	٤٦.٤	٤٦.٤	٤٦.٢	٤٦.٠	٤٣.٥		٤١.١	المتانة (جم/تكس)
٧٧.٢	٧٧.٤	٦٧.٨	٦٧.٤	٦٤.٠	٧٨.٠	٧٨.٥	٧٦.٧	٧٥.٥	٧٧.٥	٧٧.٢٩	٧٦.٠	٧٦.٧	٧٥.٤		٧٢.٨	درجة الإتكاس Rd
٨.٨	٨.٦	١١.٨	١١.٥	١١.٣	٨.٨	٨.٦	٨.٧	٨.٧	٨.٣	٨.٣	٩.٠	٨.٧	٩.١		٨.٦	درجة الإصفرار b+
٢٠.٥	١٩٨	١٥١	١٩٨	١٧٤	٢٠.٥	٢٠.٦	٢٠.٠	٢٠.٢	٢١٦	٢١٦	٢٢٣	٢١٨	٢٠.٠		٢٠.٧	ثابت الغزل
		٨٦		٨٩	٧٨	٧٩	٧٧	٨٣	٧٦	٧٦	٧٨	٧٨	٧٧		٧١	النسبة المنوية للنضج
		١٥٦		١٦٠	١٤٨	١٤٩	١٤٧	١٦٣	١٣٦	١٣٥	١٤٨	١٤٨	١٤٧		١١٥	النعمة الوزنية
		٤.٣	٩.٠	١١.٠	٣.١	٣.٠	٣.٥	٣.٧	٣.٤	٣.٧	٣.٢	٢.٨	٣.٣		٥.٦	نسبة الشوائب %
		١٢٤	٣٧٢	١٦٥	١٤٢	١٣٤	١٤١	١١٧	١٤٢	١٤٦	١٣٠	١١٨	١٤٢		٢٢٤	عدد العقد/جرام
١	٣	٤١٣	٢	٢	٢٥٨	٣٠	٢٤٦٢	٥٤٤	١٣٨	٦٩	١٤٦	٢١	١٣٥		٥	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode