



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

من ١/٩/٢٠٢٤ حتى ٣١/٨/٢٠٢٥ موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

الصنف													الصنف
٩٧Reel Cotton propagation	٩٧BCI propagation	اكسترا جيزة ٩٦ propagation	BCI ٩٤ Propagation	اكسترا جيزة ٩٤ propagation	اكسترا جيزة ٩٤ BIO-CO	اكسترا جيزة ٩٦ BCI	اكسترا جيزة ٩٦ propagation	اكسترا جيزة ٩٦ propagation	اكسترا جيزة ٩٣	اكسترا جيزة ٨٧	اكسترا جيزة ٤٥		
٣.٩٣	٣.٧١	٣.٧٦	٣.٦١	٣.٦٦	٣.٤٤	٣.٥٥	٣.٨٤	٣.٨٥	٣.١٢	٣.٥٠	٣.٣٨	قراءة الميكرووتر (ميکروجرام بوصة)	
٣٥.٥٠	٣٣.٩٩	٣٤.٤٢	٣٣.٩٩	٣٣.٩٤	٣٤.٢٢	٣٦.٤٨	٣٦.٣٢	٣٦.٤٢	٣٧.١٤	٣٦.٥٩	٣٥.٩٩	متوسط طول النصف الطوى (mm)	
٨٨.٧	٨٧.٤	٨٧.٩	٨٨.٠	٨٧.٢	٨٨.٧	٨٧.٨	٨٧.٦	٨٧.٨	٨٧.٧	٨٨.١	٨٧.٧	نسبة الانتظام (%)	
٥.٤	٥.٦	٥.٥	٥.٥	٥.٦	٥.٥	٥.٤	٥.٤	٥.٤	٥.٤	٥.٤	٥.٤	نسبة الشعيرات المقصيرة (%)	
٤٦.٦	٤٦.١	٤٦.٦	٤٦.٤	٤٦.٣	٤٧.١	٤٥.٥	٤٥.٣	٤٥.٤	٤٤.٨	٤٣.٤	٤٣.٦	المتننة (جم/نكش)	
٧٩.٢	٧٦.٨	٧٨.٣	٧٨.٠	٧٧.٠	٧٦.٩	٧٥.٣	٧٤.٧	٧٦.٥	٦٧.٤	٧٤.٢	٧٤.٥	Rd درجة الإنكس	
٨.٥	٨.٤	٨.٤	٨.٤	٨.٤	٨.٢	٨.٧	٨.٨	٨.٧	١٠.٩	٨.٣	٨.٦	b+ درجة الإصفار	
٢٢٨	٢١٨	٢٢٣	٢٢٤	٢١٨	٢٣٠	٢٢٠	٢١٩	٢٢١	٢٢٢	٢١٩	٢١٨	ثابت الغزل	
٨٦	٨١	٨٢	٨٣	٨١	٧٧.٣	٨٣	٨٢	٨١	٧٢	٨٦	٨٥	النسبة المئوية للتضخم	
١٤٧	١٤١	١٤٢	١٤٣	١٤١	١٣٩	١٥٣	١٥٢	١٥١	١٣١	١٢٦	١٢٤	النحومة الوزنية	
	٣.٦	٣.٢	٣.٤	٣.٦		٣.٢	٣.٤		٣.٤	٣.١	٣.٥	% نسبة الشوائب	
	١٨٤	١٥٥	١٥٦	١٧٠		١٦٧	١٧٣		٢٠٧	١٣٦	٢١٣	عدد العقد / جرام	
٤	٩٩	١٨	٤	٦٨	٣	٦٠	١٦٠	٤٨	٧	٢	٣	عدد العينات	

ملاحظة: الاختبار حسب نظم USDA mode