



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية  
مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)  
من ٢٠٢٢/٩/١ حتى ٢٠٢٣/٨/٣١ موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الأصناف للأقطان المصرية

الصف

super Giza ٩٤ Bci	super Giza ٩٤ reel cotton	جيزة ٩٥	Extra Giza ٩٣	جيزة ٩٨	جيزة ٩٤ super propagation	سوبر جيزة ٩٤ BCI PROPAGATION	سوبر جيزة ٩٤	سوبر جيزة ٨٦	أكسترا جيزة ٩٢ Bio cotton	أكسترا جيزة ٩٢	أكسترا جيزة ٩٢BCI	أكسترا جيزة ٩٦	أكسترا جيزة ٩٦BCI	سوبر جيزة ٩٧	إكسترا جيزة ٨٧	أكسترا جيزة ٤٥	الصفة
٣,٩٦	٤,٠٢	٤,٤٥	٢,٣٧	٤,٥٠	٣,٨٥	٤,٠٠	٣,٩٠	٤,٤٤	٣,٢٨	٣,٦٥	٣,٦٤	٤,٠٣	٤,٠٣	٣,٩٨	٣,٦٢	٢,٩٩	قراءة الميكرونيير (ميكروجرام/بوصة)
٣٣,٩٠	٣٤,٦٠	٢٩,٥٦	٣٥,٠٤	٣١,٦٤	٣٤,٣٥	٣٤,٣٥	٣٤,٠٩	٣٢,٨٤	٣٢,٦١	٣٣,٢٨	٣٣,٣٣	٣٥,٩١	٣٥,٧٧	٣٣,٥٠	٣٥,٨٠	٣٥,١٧	متوسط طول النصف العلوى (مم)
٨٦,٧	٨٦,٧	٨٣,٣	٨٦,٥	٨٦,٧	٨٧,١	٨٧,٣	٨٦,٩	٨٦,٦	٨٦,٠	٨٦,٩	٨٧,٠	٨٨,٢	٨٧,٢	٨٦,١	٨٨,٧	٨٦,٩	نسبة الانتظام (%)
٥,٦	٥,٤	٧,٧	٥,٦	٥,٩	٥,٥	٥,٤	٥,٥	٥,٨	٦,٠	٥,٧	٥,٧	٥,٤	٥,٤	٥,٧	٥,٤	٥,٤	نسبة الشعيرات القصيرة (%)
٤٠,٤	٤٠,٥	٣٦,٦	٣٧,٢	٣٨,٧	٤١,٩	٤٢,٣	٤٠,٩	٤٥,٠	٤٤,١	٤٦,١	٤٦,٣	٤٦,٢	٤٦,٠	٤٣,٣	٤١,٤	٤٠,٩	المتانة (جم/تكس)
٧٧,٢	٧٧,٤	٦٧,٨	٦٧,٤	٦٤,٠	٧٨,٠	٧٨,٥	٧٦,٨	٧٥,٣	٧٧,٠	٧٧,٤	٧٧,١٥	٧٦,٣	٧٦,٧	٧٥,٥	٧٤,٩	٧٣,٠	درجة الإحتكاس Rd
٨,٩	٨,٦	١١,٨	١١,٥	١١,٣	٨,٨	٨,٦	٨,٧	٨,٨	٨,٥	٨,٣	٨,٢	٩,٠	٨,٧	٩,١	١١,٥	٨,٨	درجة الإصفرار b+
١٩٦	١٩٨	١٥١	١٩٨	١٧٤	٢٠٥	٢٠٦	٢٠٠	٢٠١	٢٠٧	٢١٥	٢١٦	٢٢٣	٢١٨	٢٠٠	٢١٥	٢٠٧	ثابت الغزل
٧٦	٧٨	٨٦	٥٩	٨٩	٧٦	٧٨	٧٧	٨٢	٦٧	٧٦	٧٥	٧٨	٧٥	٧٧	٨٣	٧٠	النسبة المئوية للنضج
١٤٦	١٤٨	١٥٦	٩٣	١٦٠	١٤٦	١٤٨	١٤٧	١٦٢	١٢٦	١٣٦	١٣٥	١٤٨	١٤٩	١٤٧	١١٣	١١١	النوعية الوزنية
٣,٣	٣,٦	٤,٢	٩,٠	٨,٤	٣,٢	٣,٠	٣,٣	٣,٧	٣,٥	٣,٧	٣,١	٢,٨	٣,٣	٣,٢	٥,٦		نسبة الشوائب %
١٧٥	١٦١	١٢٢	٣٧٢	١٨٥	١٤٨	١٤٠	١٥٠	١١٩		١٥١	١٦٥	١٢٩	١١٧	١٥٢	٢١٧	٢٢٤	عدد العقد/جرام
٤٥	٣	٤٣٢	٢	٢	٢٥٨	٣٠	٤٨٨٩	٧٤٣	٩	١٦٩	٨١	١٨٧	٢١	١٥٧	١	٦	عدد العينات

رئيس مجلس الإدارة  
مهندس / محمد خضر

ملاحظة : الإختبار حسب نظام USDA mode